

TRACTAMENT DE LA QUERATITS HERPÈTICA SEGONS EL NIVELL D'AFECTACIÓ

Nota: aquest esquema és aplicable tant per al VHS com per al VHZ. Únicament cal remarcar que per a la queratitis epitelial per VHZ d'inici és necessari un tractament antiviral oral en forma de Valaciclovir 1g/8h. Les dosis d'antivirals sistèmics canvien de c/24h a c/12h si està el VHZ implicat.

EPITELIAL

Antiviral tòpic

Ganciclovir gel 1,5mg/g o Aciclovir pomada 30mg/g 5 vegades al dia fins que sigui fluonegatiu
Després 2 setmanes 3 vegades i després 1 setmana 1 vegada a la nit

ESTROMAL

Antiviral sistèmic

Valaciclovir 500mg/24h durant 1 any
Si ulcerada o >80kg o VHZ 500mg/12h

Corticoide tòpic

Dexametasona 1mg/ml de 3 mesos a 1 any


ENDOTELIAL

Antiviral sistèmic


Valaciclovir 500mg/24h durant 1 any
Si VHZ 500mg/12h

Corticoide tòpic


Dexametasona 1mg/ml durant 3 mesos



QUERATOCONJUNTIVITIS HERPÈTICA



EPITELIAL



Antiviral tòpic


Ganciclovir gel 1,5mg/g o Aciclovir pomada 30mg/g 5 vegades al dia fins que sigui fluonegatiu

Després 2 setmanes 3 vegades

i després 1 setmana 1 vegada a la nit

*Si VHZ tractament oral sempre

ESTROMAL




Antiviral sistèmic

Valaciclovir 500mg/24h durant 1 any
Si ulcerada o >80kg o VHZ 500mg/12h

Corticoide tòpic

Dexametasona 1mg/ml de 3 mesos
a 1 any

ENDOTHELIAL



Antiviral sistèmic

Valaciclovir 500mg/24h durant 1 any
Si VHZ 500mg/12h

Corticoide tòpic

Dexametasona 1mg/ml durant 3
mesos

Famciclovir

Famvir

FILTRAT
GLOMERULAR



EPITELIAL




ÚLCERA
GEOGRÀFICA



ESTROMAL
ULCERADA



ESTROMAL
NO
ULCERADA



ENDOTELIAL

PROFILAXI

≥ 60

250 mg
3 o 2 cops/dia

500 mg
3 o 2 cops/dia

500 mg
2 cops/dia

125 mg
2 cops/dia

250 mg
3 o 2 cops/dia

250 mg
3 o 2 cops/dia

40-59

250 mg
2 cops/dia

500 mg
2 cops/dia

500 mg
2 cops/dia

125 mg
2 cops/dia

250 mg
2 cops/dia

250 mg
2 cops/dia

20-39

125 mg
2 cops/dia

500 mg
1 cop/dia

500 mg
1 cop/dia

125 mg
2 cops/dia

125 mg
2 cops/dia

125 mg
2 cops/dia

<20

125 mg
1 cop/dia

250 mg
1 cop/dia

250 mg
1 cop/dia

125 mg
1 cop/dia

125 mg
1 cop/dia

125 mg
1 cop/dia

HEMODIÀLISI

125 mg post
hemodiàlisi

250 mg post
hemodiàlisi

250 mg post
hemodiàlisi

125 mg post
hemodiàlisi

125 mg post
hemodiàlisi

125 mg post
hemodiàlisi

SEQÜELES

Atròfia
iridiana

Exsudats
lipídics

Edema

Vascularització
corneal

Úlcera
neurotròfica

A. Armit

